

HODOWLA BRODATKI ŚRODKOWOAUSTRALIJSKIEJ - AGAMY BRODATEJ

Przewodnik hodowlany



Autor: ZOO TEAM

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wybór zdrowego osobnika	4
3. Wymagania terraryjne	5
4. Oświetlenie i ogrzewanie	7
5. Dieta i suplementacja	8
6. Zachowanie i codzienna opieka	10
7. Zdrowie i profilaktyka	11
8. Odmiana Silkback – dylematy etyczne	12
9. Gdzie pogłębiać wiedzę – polecane źródła i szkolenia	13
Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o agamie brodatej!	15

1. Wstęp



Agama brodata, znana także jako brodatka środkowoaustralijska, to jedna z najpopularniejszych jaszczurek hodowanych w warunkach domowych. Łagodny charakter, ciekawa mimika i stosunkowo proste wymagania czynią ją idealnym gadem dla początkujących miłośników terrarystyki. Poniższy poradnik pomoże Ci zrozumieć potrzeby tego gatunku i stworzyć odpowiednie warunki do jego zdrowego rozwoju.

Agama brodata pochodzi głównie z południowo-zachodniej i środkowej Australii, gdzie zamieszkuje suche, pustynne i półpustynne obszary, sawanny oraz otwarte tereny skaliste.

W naturalnym środowisku przystosowała się do wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia, co ma bezpośrednie przełożenie na jej potrzeby w hodowli.

Do terrarystyki trafiła w drugiej połowie XX wieku i szybko zdobyła popularność w Europie i Ameryce Północnej. Jej spokojne usposobienie, niewielkie rozmiary (dorosły osobnik osiąga zazwyczaj 45–60 cm) i stosunkowo niskie wymagania sprawiły, że stała się jedną z najczęściej wybieranych jaszczurek przez początkujących opiekunów.

Na rynku terrarystycznym dostępnych jest wiele **odmian barwnych**, m.in.:

- Normal (dzika forma) – ubarwienie szarobrązowe, najlepiej przystosowane do naturalnych warunków,
- Sandfire – ciepłe odcienie czerwieni i pomarańczy,
- Citrus – jasnożółta, cytrynowa barwa,
- Hypo – odmiana o zmniejszonej pigmentacji i jaśniejszych pazurach,
- Trans – osobniki z przezroczystymi tęczęwkami, przezroczystą i ciemniejszą skórą,
- Silkback – pozbawiona łusek, o czym szerzej w rozdziale 8.

Brodatki są stosunkowo łatwe do oswojenia. Regularnie obsługiwane przez człowieka potrafią rozpoznawać opiekuna, reagują na jego obecność i uczą się rutyny dnia codziennego. Niektóre (nie jest to norma) osobniki potrafią nawet sygnalizować potrzebę jedzenia lub wyjście z terrarium poprzez obserwowanie i wykonywanie charakterystycznych ruchów. Łatwo adaptuje się do warunków domowych, a jej obserwacja dostarcza wielu emocji i satysfakcji, szczególnie dzieciom.

2. Wybór zdrowego osobnika



Wybierając agamę brodatą, warto poświęcić czas na ocenę kondycji zdrowotnej zwierzęcia.

Zdrowy osobnik wykazuje się następującymi cechami:

- Jasne, szeroko otwarte oczy,
- Silna reakcja na bodźce – ruch, dotyk, nowe otoczenie,
- Jędrne, symetryczne ciało bez zapadnięć w okolicy brzucha,
- Równe, nieuszkodzone kończyny i ogon,
- Sprawnie porusza się i wspina po powierzchniach,
- Skóra bez ran, zaczerwienień i zmian martwiczych,
- Czyste nozdrza oraz brak wydzielin z oczu i nosa.
- Wyraźny apetyt podczas karmienia,
- Prawidłowo ukształtowany otwór kloakalny.

Niepokojące objawy, które powinny wzbudzić czujność, to:

- Ospłość, brak reakcji,
- Zamknięte lub przymglone oczy,
- Zapadnięte boki ciała,
- Deformacje kończyn lub ogona (mogą świadczyć o przebytych złamaniach lub krzywicy),
- Skóra łuszcząca się nierównomiernie lub z czarnymi plamami,
- Obecność pasożytów zewnętrznych,
- Biegunki, wydzieliny z nosa lub pyska.

Wiek agamy – młody czy dorosły osobnik?

Decyzja o zakupie młodej lub dorosłej jaszczurki zależy od doświadczenia opiekuna oraz celu hodowli.

Zalety zakupu młodego osobnika (2–4 miesiące):

- Większa szansa na oswojenie się ze środowiskiem domowym,
- Możliwość obserwowania pełnego cyklu wzrostu,
- Łatwiejsze budowanie relacji z opiekunem od najmłodszych chwil.

Wady:

- Większe ryzyko błędów w żywieniu i opiece,
- Większa wrażliwość na nieprawidłowe warunki - wymagają bardziej precyzyjnej kontroli temperatury i wilgotności,

- Trudniejsze rozpoznanie ewentualnych wad rozwojowych w pierwszych tygodniach życia.

Zalety zakupu dorosłego osobnika (powyżej 10 miesięcy):

- Ustabilizowany charakter i zachowanie,
- Odporność na błędy początkujących,
- Możliwość szybszego rozpoznania płci i stanu zdrowia.

Wady:

- Trudniejsza adaptacja do nowego środowiska,
- Przyzwyczajenie do wcześniejszych nawyków i opiekunów,
- Niektóre osobniki mogą być mniej ufne wobec człowieka.

Przy zakupie warto skonsultować się z doświadczonym hodowcą, który potrafi prawidłowo ocenić stan zdrowia i pomoże dobrać odpowiedniego osobnika do naszych możliwości.

3. Wymagania terraryjne



Agamy brodate to jaszczurki pustynne, dlatego terrarium powinno jak najlepiej odwzorowywać warunki naturalne: być suche, dobrze oświetlone, z możliwością regulacji temperatury i bezpieczne.

Minimalne wymiary terrarium:

- Dla jednego dorosłego osobnika: 120x60x60 cm (długość x szerokość x wysokość),
- Dla pary lub większych układów: co najmniej 150x60x60 cm.

Terrarium powinno być poziome, ponieważ agamy spędzają większość czasu na powierzchni i na niskich podwyższeniach. Wentylacja powinna być zapewniona z góry oraz z przodu lub z boku – dobra cyrkulacja powietrza zapobiega rozwojowi pleśni i utrzymuje odpowiedni mikroklimat.

Podłoże

Najbezpieczniejsze dla młodych jaszczurek jest podłoże stałe, np. mata kokosowa, wykładzina reptile carpet, płyty ceramiczne lub ręczniki papierowe. Dla dorosłych dopuszczalny może być specjalistyczny, drobnoziarnisty piasek pustynny lub wykonany z węgla wapnia (CaCO_3), ale tylko pod warunkiem, że nie stanowi ryzyka przypadkowego połknięcia. Należy unikać sypkich podłoży (np. żwiru, piasku kwarcowego, pelletów


drewnianych), ponieważ mogą prowadzić do zaczopowania układu pokarmowego. Dobrym rozwiązaniem będzie mieszanina gliny z piaskiem, którą po wymieszaniu z wodą do konsystencji gęstej śmietany wylewamy na dno terrarium. Po wyschnięciu mieszanki otrzymamy twardą warstwę wspomagającą jednocześnie ścieranie pazurków u jaszczurki. To rozwiązanie nie stosujemy jednak u samic znoszących jaja, bo muszą one mieć możliwość wykopania dołka. Brak takiej możliwości może doprowadzić do zaczopowania jajami, które jaszczurka nie będzie chciała znieść na twardej skorupie.

Wystrój terrarium

W terrarium nie powinno być szczelin, pustych przestrzeni i drobnych zakamarków, w których mogłyby zagnieździć się owady karmowe. Świerszcze, karaczany, drewnojady czy mączniki mogą się rozmnażać lub chować w zakamarkach, co prowadzi do:

- Zniszczeń wystroju poprzez drążenie w podłożu lub dekoracjach,
- Utraty kontroli nad liczbą owadów w terrarium,
- Ryzyka ataku na jaszczurkę, zwłaszcza podczas linienia lub snu.

Z tego względu należy dbać o szczelność konstrukcji oraz regularnie usuwać niewyłapane owady po karmieniu.




Elementy wystroju powinny zapewniać możliwość wspinaczki i wygrzewania się: konary, korzenie, skały, platformy. Należy również umieścić schronienie, w którym agama będzie mogła się ukryć.

Dodatkowe wyposażenie techniczne obejmuje termometr i higrometr, najlepiej cyfrowe, oraz termostat do kontroli źródeł ciepła. Choć agamy pochodzą z klimatu suchego (wilgotność powinna być utrzymywana na niskim poziomie (około 30-40%)), w okresie linienia warto zapewnić im nawilżane miejsce – np. mały pojemnik z wilgotnym mchem sphagnum i podnieść nieco ogólną wilgotność poprzez spryskiwanie elementów wystroju.

4. Oświetlenie i ogrzewanie

Brodatka to jaszczurka dzienna, pochodząca z nasłonecznionych obszarów Australii, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i temperatury w terrarium ma kluczowe znaczenie dla jej zdrowia i samopoczucia.

Światło UVB



Promieniowanie UVB jest niezbędne do syntezy witaminy D3, która umożliwia przyswajanie wapnia i zapobiega krzywicy (Metabolic Bone Disease (MBD)). Standardowo zaleca się świetlówki UVB 10%, ale w wyższych terrariach (powyżej 50–60 cm) warto zastosować mocniejsze źródła:

12% lub 15% UVB. Promieniowanie traci skuteczność wraz z odległością od źródła. Lampy UVB należy wymieniać co 6-12 miesięcy, ponieważ tracą skuteczność nawet jeśli nadal świecą.

Najlepszy efekt dają świetlówki liniowe T5 o dużym zasięgu i równomiernym pokryciu. Kompaktowe świetlówki UVB działają tylko na krótkim dystansie (20–30 cm), więc w dużym terrarium mogą nie wystarczyć – należy je wtedy podwoić lub zastąpić liniowymi T5. Można też stosować lampy metahalogenowe HID lub solarne (rtęciowe) – tzw. 3w1. Generują one jednocześnie promienie UVA/UVB i ciepło (uwaga: duże ryzyko poparzenia, brak możliwości zmniejszania temperatury).

Lampy UVB powinny być włączone przez 10–12 godzin dziennie, najlepiej z użyciem odbłyśników.

Warto też unikać elementów wystroju, które mogą zasłaniać promieniowanie UVB, takie jak np. piętrowe półki skalne generujące duży cień w dolnych partiach terrarium.

Światło widzialne

Silne światło widzialne wspiera rytm dobowy agamy i jej aktywność. Świetlówki dzienne, światła LED o wysokim CRI (>80) oraz naturalne światło dzienne (przy zachowaniu odpowiednich filtrów UV) pobudzają apetyt i naturalne zachowania.

Ogrzewanie

W terrarium należy stworzyć gradient cieplny:

- **Strefa wygrzewania (bezpośrednio pod źródłem ciepła):** 40–42°C,

- **Strefa pośrednia:** 28–32°C,
- **Strefa chłodna:** 24–26°C,
- **Temperatura nocna:** 18–22°C (bez dogrzewania, chyba że spada poniżej 16°C).

Źródłem ciepła powinna być żarówka grzewcza lub ceramiczny promiennik, zamontowany z góry w osłonie zabezpieczającej. Grzanie od dołu (np. maty lub kamienie grzewcze) nie jest odpowiednie dla agam ponieważ regulują one temperaturę ciała głównie przez wygrzewanie się pod źródłem ciepła emitowanym z góry (w naturze ze słońca).

Kontrola warunków

Nieodzowne są: termometr (najlepiej cyfrowy z sondą), higrometr, a także termostat chroniący przed przegrzaniem. Oświetlenie i ogrzewanie należy ustawić tak, aby odwzorowywać cykl dnia i nocy, najlepiej za pomocą programatorów czasowych.

5. Dieta i suplementacja



Agamy brodate są wszystkożerne, jednak ich dieta zmienia się znacznie wraz z wiekiem. Młode osobniki potrzebują więcej białka pochodzenia zwierzęcego, natomiast dorosłe bazują głównie na pokarmie roślinnym. Należy unikać roślin zawierających szczawiany i goitrogeny, które mogą zaburzać metabolizm wapnia (np. kapusta, brokuły).

Dieta młodej agamy (do ok. 8–10 miesiąca życia)

Młode osobniki powinny otrzymywać pokarm zwierzęcy codziennie, a roślinny jako uzupełnienie.

Zalecane owady karmowe:

- Świerszcze (domowy, bananowy, kubański),
- Karaczany (tureckie, argentyńskie),
- Szarańcza,
- Larwy muchy *Hermetia illucens* (black soldier fly),
- Larwy moli woskowych (okazjonalnie, ze względu na wysoką zawartość tłuszczu),
- Drewnojady (sporadycznie),
- Mączniki (w ograniczonych ilościach).

Owady powinny być karmione wartościowymi warzywami („gut loading”) i posypywane suplementem wapnia (4-5 razy w tygodniu) oraz preparatem witaminowym z dodatkiem witaminy D3 (1–2 razy w tygodniu). Owady powinny pochodzić z hodowli, a nie odławiane w środowisku naturalnym (mogą przenosić pasożyty i niebezpieczne substancje).

Dieta roślinna dla młodych agam:

- Rośliny polecane (do codziennego stosowania): rukola, mniszek lekarski (liście i kwiaty), babka lancetowata, koniczyzna, cykoria, roszponka, endywia,
- Rośliny okazjonalne: sałata rzymska, marchew, ogórek, kabaczek, cukinia,
- Rośliny zakazane: sałata lodowa (uboga w wartości odżywcze), szpinak (zawiera szczawiany), szczaw, cebula, czosnek, awokado.

Dieta dorosłej agamy (powyżej 10 miesiąca życia)

- U dorosłych osobników głównym składnikiem diety (70–80%) powinny być rośliny.
- Pokarm zwierzęcy podaje się nie częściej niż 2–3 razy w tygodniu.

Dieta roślinna dla dorosłych osobników:

- Codziennie: jarmuż, mniszek, bazylia, roszponka, liście rzepy, dynia, cukinia,
- Okazjonalnie: marchew, papryka, burak,
- Zakazane: warzywa kapustne (kapusta biała, brukselka – zaburzają gospodarkę wapniową), rośliny o wysokiej zawartości szczawianów.

Suplementacja u dorosłych:

- Wapń – 3–4 razy w tygodniu,
- Preparat wielowitaminowy – 1 raz w tygodniu , a w przypadku diety bogatej w rośliny dzikie nawet rzadziej.

Suplementacja wapnia i witamin powinna być regularna, ale z zachowaniem umiaru, aby uniknąć hiperkalcemii.

Pokarm podaje się w ciągu dnia – najlepiej rano, gdy agama się już wygrzeje. Rośliny można spryskiwać wodą, co zwiększy ich atrakcyjność i wspomogę nawodnienie.

Wodę należy zapewniać w misce o płytkich brzegach lub pod postacią regularnego spryskiwania warzyw – agamy rzadko piją wodę z naczyń, ale mogą z niej korzystać przy odpowiednim ustawieniu.

Urozmaicona dieta i odpowiednia suplementacja to klucz do zdrowego wzrostu, dobrej odporności i długowieczności Twojej agamy.

6. Zachowanie i codzienna opieka



Agamy brodate to jaszczurki dzienne, aktywne i zazwyczaj spokojne w kontakcie z człowiekiem. Wielu opiekunów określa je jako „towarzyskie”, ponieważ szybko uczą się rozpoznawać człowieka, obserwują otoczenie i pozwalają się brać na ręce.

Trzeba jednak pamiętać, że zwierzę nie jest zabawką – to żywa istota wymagająca spokoju, odpowiednich warunków i czasu na odpoczynek. Choć dobrze znosi kontakt z człowiekiem, nie powinna być noszona na rękach przez dzieci przez dłuższy czas (dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych podczas kontaktu z agamą), ani wypuszczana na podłogę na zbyt długie sesje „zabawy”. Po zakupie lub przeprowadzce agama brodata potrzebuje czasu na adaptację i nie powinna być nadmiernie stresowana częstym manipulowaniem.

Zbyt długi kontakt fizyczny lub wyziębienie może prowadzić do stresu i problemów zdrowotnych, a kontakt z podłożem domowym (np. parkietem, dywanem) naraża jaszczurkę na wychłodzenie, uszkodzenia pazurów i zainfekowanie skóry.

Agama potrzebuje stabilnej rutyny dnia: wygrzewania się rano, aktywności w ciągu dnia, i stopniowego wyciszenia wieczorem. Warto obserwować zachowania – zmiana aktywności, apatia lub brak apetytu mogą być sygnałem ostrzegawczym.


W okresie jesienno-zimowym mogą wykazywać mniejszy apetyt i obniżoną aktywność, a czasami nawet przechodzić w stan częściowej brumacji (zimowego spoczynku). To naturalne zjawisko, pod warunkiem, że zwierzę jest zdrowe i nie występują dodatkowe objawy chorobowe. W okresie brumacji należy zapewnić stabilne warunki i nie wymuszać aktywności.

Codzienna opieka nad agamą obejmuje:

- Poranne uruchomienie oświetlenia i sprawdzenie temperatury,
- Karmienie i usunięcie resztek jedzenia,
- Kontrolę obecności owadów w terrarium,
- Obserwację zachowania i wyglądu skóry,
- Zapewnienie czystej wody i higieny misek,
- Sprzątanie punktowe, a raz w tygodniu – większe porządki.

Zadbana agama odwdzięczy się zaufaniem, spokojem i możliwością budowania prawdziwej więzi ze swoim opiekunem.

7. Zdrowie i profilaktyka



Utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej agamy brodatej wymaga odpowiedniej profilaktyki i szybkiego reagowania na pierwsze oznaki problemów. Regularna obserwacja jaszczurki i znajomość jej naturalnych zachowań to podstawa.

Najczęstsze problemy zdrowotne:

Krzywica (MBD) – występuje przy niedoborze wapnia, przy niewłaściwej diecie lub niewystarczającej ekspozycji na promieniowanie UVB. Objawy to drżenia kończyn, zniekształcenia kości, trudności w poruszaniu się. Leczenie wymaga zwiększenia dawki wapnia i witaminy D3 oraz zapewnienia silnego źródła UVB.

Zaparcia i zaczopowania – mogą być skutkiem poćknięcia nieodpowiedniego podłoża (profilaktycznie należy unikać podłoży, które mogą być poćknięte i powodować problemy), dużych lub twardych owadów, a także odwodnienia. Objawy to opuchnięty brzuch, brak wypróżnień i osowiałość. Czasem pomocna jest kąpiel w letniej wodzie, ale w cięższych przypadkach konieczna jest interwencja weterynaryjna.

Pasożyty przewodu pokarmowego – mogą być obecne u agam z niepewnego źródła. Objawy to biegunki, utrata masy ciała, osowiałość. Raz do roku warto wykonać profilaktyczne badanie kału w lecznicy (lub częściej przy podejrzeniu problemów zdrowotnych).

Infekcje jamy ustnej (mouth rot) – często wynikają z urazów lub niewłaściwej wilgotności. Pojawiają się opuchlizna, białe lub żółte naloty, nieprzyjemny zapach z pyska. Leczenie wymaga konsultacji z lekarzem weterynarii.

Oparzenia i odmrożenia – wynikają z niewłaściwego montażu źródeł ciepła lub wychłodzenia poza terrarium. Lampy grzewcze powinny być osłonięte, a agama nie powinna mieć do nich bezpośredniego dostępu.

Problemy skórne i linienie – utrudnione linienie może wskazywać na zbyt niską wilgotność. Agama może potrzebować wilgotnej kryjówki lub kąpeli. Należy unikać zrywania skóry ręcznie.

Profilaktyka zdrowotna obejmuje:

- Zbilansowaną dietę z odpowiednią suplementacją wapnia i witamin,
- Stały dostęp do promieniowania UVB,
- Właściwą temperaturę i wilgotność,
- Zachowanie higieny terrarium (codzienne sprzątanie punktowe, dezynfekcja co kilka tygodni),
- Kontrolę jakości podłoża i jego regularną wymianę,
- Unikanie stresu i gwałtownych zmian warunków,
- Okresowe badania kontrolne u weterynarza specjalizującego się w gadach.

Każda nagła zmiana zachowania, wyglądu skóry, oddechu lub apetytu powinna być sygnałem do konsultacji z lekarzem weterynarii. Im szybciej wykryjemy problem, tym większe szanse na skuteczne leczenie.

8. Odmiana Silkback – dylematy etyczne



Odmiana Silkback (inaczej Leatherless) to efekt selektywnej hodowli agamy brodatej, polegającej na całkowitym wyeliminowaniu łusek z powierzchni skóry. Choć nie można odmówić jej niezwykłego wyglądu – gładka, lśniąca skóra często intensywniej ukazuje kolory i wzory – to jednak ta cecha wiąże się z licznymi problemami zdrowotnymi i etycznymi.

Problemy zdrowotne u odmiany Silkback:

- Brak łusek skutkuje wyjątkową wrażliwością skóry – łatwo o otarcia, urazy i infekcje grzybicze,
- Problemy z linieniem – martwa skóra nie oddziela się równomiernie, co prowadzi do powstawania zatorów i stanów zapalnych,
- Zwiększone ryzyko odwodnienia – brak łusek oznacza utratę funkcji ochronnych naskórka,
- Większe wymagania środowiskowe – Silkback potrzebuje wyższej wilgotności, bardziej miękkiego podłoża i częstszej kontroli temperatury,
- Podatność na stres – niektóre osobniki są bardziej lękliwe i wrażliwe na zmiany otoczenia.

Aspekty etyczne:

W środowisku hodowców i weterynarzy coraz częściej pojawiają się głosy sprzeciwu wobec rozmnażania tej odmiany. Wielu specjalistów uznaje ją za przykład selekcji kierowanej wyłącznie estetyką, kosztem dobrostanu zwierząt.

Niektórzy hodowcy zrezygnowali z dalszego rozmnażania Silkbacków, powołując się na ich zwiększoną śmiertelność, słabszą jakość życia i konieczność specjalistycznej opieki.

Międzynarodowe Towarzystwo Herpetologiczne (IHS) ogłosiło istotną aktualizację swojej polityki dotyczącej sprzedaży gadów na eventach. Od września 2025 roku wprowadzony zostaje zakaz handlu odmianą Silkback.

Podsumowanie:

Jeśli rozważasz opiekę nad agamą odmiany Silkback, powinieneś mieć doświadczenie w hodowli gadów i dostęp do profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Dla początkujących opiekunów rekomendowane są odmiany standardowe lub hypo, które nie wymagają aż tak intensywnej kontroli środowiska i zdrowia.

Świadomy wybór hodowlanego kierunku to nie tylko kwestia estetyki, ale też odpowiedzialności wobec zwierzęcia i jego naturalnych potrzeb.

9. Gdzie pogłębiać wiedzę – polecane źródła i szkolenia

Opieka nad agamą brodatą to proces, który wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Nawet doświadczeni hodowcy wciąż uczą się nowych metod opieki, diagnostyki i wzbogacania środowiska życia gadów. Dlatego warto korzystać z rzetelnych źródeł i profesjonalnych szkoleń.

Zalecane źródła wiedzy:

- Strona internetowa i forum Pogona.pl – szczególnie rozbudowane działy dotyczące diety roślinnej i chorób,
- Książki o hodowli gadów, np. „Bearded Dragons” (Philip Purser), „The Bearded Dragon Manual” (Philippe de Vosjoli i in.), „O Agamach Stów Kilka” (Paulina Gwiazda),
- Kanały edukacyjne na YouTube prowadzone przez hodowców,
- Grupy społecznościowe i fora tematyczne poświęcone terrarystyce – z zastrzeżeniem, by weryfikować porady i nie kierować się wyłącznie opiniami użytkowników bez doświadczenia.

Szkolenia stacjonarne – ZOO TEAM AKADEMIA



Jeśli chcesz nauczyć się obsługi terrarium w praktyce, poznać anatomię i behavior agamy brodatej z bliska oraz dowiedzieć się, jak rozpoznać pierwsze objawy problemów zdrowotnych, rozważ udział w szkoleniach organizowanych przez [ZOO TEAM AKADEMIA](#).

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych hodowców, a zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń praktycznych – idealne zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych opiekunów.

Tematy poruszane podczas szkoleń:

- Dobór i urozmaicanie diety,
- Seksowanie i rozmnażanie jaszczurek,
- Suplementacja, rozpoznawanie niedoborów,
- Prawidłowe zakładanie terrarium i dobór sprzętu,
- Interpretacja zachowań i reagowanie na niepokojące symptomy,
- Podstawy pierwszej pomocy i opieki w trudnych sytuacjach zdrowotnych.

Dlaczego warto?

Zajęcia w ramach [ZOO TEAM AKADEMIA](#) to nie tylko źródło wiedzy, ale też świetna okazja do wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami. To także bezpieczne środowisko, w którym można zadawać pytania, uczyć się na błędach i ćwiczyć praktyczne umiejętności z bezpośrednim wsparciem specjalistów.

Przygoda z agamą brodatą to wielka odpowiedzialność, ale też ogromna satysfakcja. Zadbaj o warunki, dietę i bezpieczeństwo swojego gada, a zyskasz przyjaciela na wiele lat.



Quiz: Sprawdź swoją wiedzę o agamie brodatej!

Zaznacz poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi znajdziesz na końcu testu – nie podglądaj zbyt szybko 😊

1. Jakie promieniowanie UVB jest zalecane dla agamy brodatej w standardowym terrarium o wysokości 60 cm?

- A) 2%
- B) 4%
- C) 5%
- D) 10%

2. Który owad karmowy może być podawany okazjonalnie, ze względu na wysoką zawartość tłuszczu?

- A) Świerszcze
- B) Szarańcza
- C) Larwy moli woskowych
- D) Karaczany

3. Która roślina jest zakazana w diecie agamy brodatej?

- A) Szpinak
- B) Mniszek lekarski
- C) Cykoria
- D) Rukola

4. Jakie są objawy krzywicy (MBD) u agamy?

- A) Częste ziewanie
- B) Utrata ogona
- C) Zniekształcenia kości, drżenie kończyn
- D) Intensywne linienie

5. Czym grozi stosowanie sypkiego podłoża (np. piasku) w terrarium?

- A) Alergią u człowieka
- B) Zaczopowaniem przewodu pokarmowego po połknięciu
- C) Zbyt dużą wilgotnością
- D) Podrażnieniem oczu

6. Jak często dorosła agama brodata powinna otrzymywać owady karmowe?

- A) Codziennie
- B) 2–3 razy w tygodniu
- C) Raz na miesiąc
- D) Tylko zimą

7. Jakie zachowanie jest typowe dla agamy w okresie jesienno-zimowym?

- A) Zwiększona agresja
- B) Wzmożony apetyt
- C) Spadek aktywności i mniejszy apetyt
- D) Składanie jaj

8. Jakie ryzyko niesie za sobą wypuszczanie agamy brodatej na podłogę bez nadzoru?

- A) Poślizgnięcie się i upadek
- B) Kontakt z insektami domowymi
- C) Ucieczka do ogrzewania
- D) Wyziębienie, urazy, infekcje

9. Która cecha charakteryzuje odmianę Silkback?

- A) Intensywna broda
- B) Brak pazurów
- C) Brak łusek na skórze
- D) Zmienna barwa

10. Dlaczego odmiana Silkback budzi kontrowersje etyczne?

- A) Nie toleruje światła UVB
- B) Jest trudna do rozmnożenia
- C) Ma większy apetyt
- D) Jest bardziej podatna na choroby i urazy

Prawidłowe odpowiedzi:

1. **D**
2. **C**
3. **A**
4. **C**
5. **B**
6. **B**
7. **C**
8. **D**
9. **C**
10. **D**

Wyniki:

9–10 pkt – Jesteś prawdziwym znawcą agam brodatych!

6–8 pkt – Dobra robota, ale warto wrócić do kilku rozdziałów.

0–5 pkt – Czas na powtórkę – Twoja agama Ci za to podziękuje!

